

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Полигемостат®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Полигемостат®

Лекарственная форма: порошок для местного и наружного применения

Состав:

Действующие вещества:

| | |
|--|----------|
| ε-Аминокапроновая кислота | 0,1500 г |
| Хлоргексидина биглюконат в виде 0,05 % раствора | 0,0025 г |
| Дуба коры экстракт (дуба коры экстракт сухой) | 0,5375 г |
| Зверобоя травы экстракт (зверобоя травы экстракт сухой) | 0,0250 г |
| Тысячелистника обыкновенного травы экстракт (тысячелистника травы экстракт сухой) | 0,0250 г |
| Хвоща полевого травы экстракт (хвоща полевого травы экстракт сухой) | 0,0250 г |
| Крапивы двудомной листьев экстракт (крапивы двудомной листьев экстракт сухой) | 0,0250 г |

Вспомогательное вещество:

| | |
|------------------|----------|
| Кальция альгинат | 1,7100 г |
|------------------|----------|

Описание: порошок от коричневого до темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: гемостатическое средство для наружного и местного применения

Код АТХ: B02BC

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Аминокапроновая кислота, угнетая фибринолиз, предотвращает вторичное кровотечение. Дуба коры экстракт обеспечивает частичную коагуляцию белков плазмы и оказывает противовоспалительное действие. При контакте с раневой поверхностью дубильные вещества коры дуба обеспечивают быстрое образование тромба, тем самым останавливая кровотечение. Крапивы, тысячелистника, зверобоя, хвоща экстракты активизируют

репаративные процессы в ране. Хлоргексидин является антисептиком, что предотвращает развитие инфекций в ране.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не изучалась.

Показания к применению

Капиллярные и венозные кровотечения у взрослых.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность; период лактации.

Способ применения и дозы

Полигемостат применяют местно однократно. Саше с препаратом вскрывают непосредственно перед применением и сразу после осушения кровоточащей раневой поверхности наносят порошок равномерным слоем, затем прижимают его марлевой салфеткой до полной остановки кровотечения. На ранах с невысокой интенсивностью кровотечения допускается применение препарата без предварительного осушения раневой поверхности марлевой салфеткой и без последующего прижатия ею слоя препарата. При недостаточной толщине слоя порошка на поверхность может выступить несвернувшаяся кровь. В этом случае следует приподнять марлевую салфетку и на кровоточащие участки досыпать дополнительное количество препарата, а затем вновь прижать.

Побочные явления

До настоящего времени не наблюдались. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Отсутствуют данные о нежелательном взаимодействии с другими лекарственными средствами.

Форма выпуска

Порошок для местного и наружного применения.

По 2,5 г в пакетики (саше) термосвариваемые из материала комбинированного.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50 пакетиков вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

По 2,5 г в пакетики (саше) термосвариваемые из материала комбинированного. Каждое саше помещают в отдельный герметичный пакет из полиэтилена высокого давления.

По 1, 2, 5, 10, 20, 50 пакетиков вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

По истечении срока годности не применять.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д.70.

Организация, принимающая претензии

ООО «Технопарк-Центр», Россия, 123557, г. Москва, ул. Климашкина д. 22, стр. 1.

Тел./факс: (495) 994-94-79.

Адрес места производства

ООО «Технопарк-Центр», Россия, Московская обл., Талдомский район, пос. Вербилки, ул. Лермонтова, тел./факс: (495) 994-94-79.